

INSTRUCTIES BMP E

In de BMP-handleiding komt de nieuwe variant BMP Enkele soorten nog niet aan bod. Met onderstaande informatie en de BMP-handleiding kunt u aan de slag.



Soorten en gebieden

BMP E richt zich op 23 vogelsoorten (z.o.z).

Er kan gekozen worden voor één soort of meer soorten.

Houdt een eenmaal gekozen soortenlijst gedurende meerdere jaren aan.

SOVON heeft voorkeur voor het inventariseren van bepaalde soorten in bepaalde gebieden: kijk op www.sovon.nl/Monitoring/Broedvogels en dan onderaan in de tekst **wensenlijst** aanklikken. In Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitatrictlijn) bij voorkeur de 9 aangewezen soorten inventariseren. Afhankelijk van de soorten en het landschap kan een telgebied 50 tot 1000 ha groot zijn.

Soorten van BMP E kunnen als extra soorten worden meegenomen bij de inventarisatie in bestaande gebieden in het kader van BMP Roofvogels (bijv. Ransuil) of LSB Zeldzame soorten. Ook hier een vaste soortenlijst aanhouden.

SOVON heeft belangstelling voor telgegevens van BMP E-soorten uit de periode vanaf 1980 (zie Verwerking).

Aanmelding

BMP E werkt met vaste telgebieden. Een nieuw gebied altijd vooraf aanmelden door insturen van het formulier AP (Aanmelding Proefvlak) en een gebiedskaart met de precieze begrenzing daarop ingetekend. Dit telgebied moet elk jaar volledig worden onderzocht. Mochten enkele delen binnen het telgebied niet onderzocht worden (verboden of ontoegankelijk), dan deze deelgebieden op de kaart markeren en ze ook in latere jaren niet meetellen. Dit kan bijv. optreden bij Boerenzwaluwtellingen waarbij voor enkele boerderijen geen toestemming voor betreding kan worden verkregen. Maak het telgebied niet te groot, zodat het ook in jaren waarin u minder tijd ter beschikking heeft in zijn geheel geteld kan worden. Hanteer dus liever meerdere kleine telgebieden, waarvan een aantal desnoods niet elk jaar geteld wordt, dan één groot telgebied, waarvan dan een deel niet is onderzocht.

Inventarisatie

Van tellers wordt verwacht dat ze jaarlijks dezelfde werkwijze, gebiedsdekking en aantal en timing van bezoeken aanhouden. Dus niet het ene jaar uitsluitend nesten tellen en in het andere jaar territoria. Als algemene regel geldt dat per soort minimaal twee bezoeken in de optimale inventarisatieperiode, dus *tussen de datumgrenzen* worden afgelegd. Raadpleeg bijlage 5 van de BMP-handleiding en de opmerkingen per soort (z.o.z.). Tijdens een bezoekenronde wordt het gehele telgebied (of alle geschikte biotopen binnen het gebied) afgewerkt. Een bezoekenronde kan uit meerdere bezoeken in verschillende deelgebieden bestaan. Bij meer soorten de bezoeken rondes over het seizoen verdelen, met in het algemeen een zwaartepunt tussen half april en half juni. Twee opeenvolgende bezoeken rondes dienen minstens 10 dagen uit elkaar te liggen.

Interpretatie van de veldgegevens uitvoeren volgens richtlijnen en criteria in de BMP-handleiding.

Verwerking

In het eerste jaar moeten nieuwe tellers het telformulier E en de soortkaarten met interpretatie erop, op papier insturen. De resultaten lopen wij door en geven daarop opbouwend commentaar, waarop gereageerd kan worden.

Elk jaar worden de vastgestelde aantallen online ingevuld of op telformulier E. Geef aan welke soorten zijn geïnventariseerd, ook die met nul paren (wel onderzocht, maar niet aanwezig). Van elke soort wordt de hoogst waargenomen broedcode gevraagd.

In bestaande telgebieden BMP Roofvogels en LSB Zeldzame soorten kunnen geïnventariseerde soorten worden bijgeschreven online (onderaan opzoeken) of op het telformulier. Hierbij ook soorten met nul paren invullen (wel onderzocht, niet aanwezig) en elk jaar deze soorten bijschrijven!

Heeft u telgegevens van BMP E-soorten vanaf 1980, die voldoen aan de gestelde eisen (vast gebied, dezelfde werkwijze e.d.) dan kunt u die in een Excelbestand of op papier opsturen naar SOVON.

Formulieren kaarten etc. kunt u gratis naar SOVON opsturen via Antwoordnr. 98189, 6500 VA Nijmegen.

Voor vragen, opmerkingen en gegevens kunt u terecht bij: *Arend van Dijk*
Coördinator BMP
arend.vandijk@sovon.nl

We zijn benieuwd naar uw telresultaten!

Vogelsoorten van BMP E

* Bij voorkeur inventariseren in Natura 2000 gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn)

Soort	datumgrenzen	opmerkingen
* Dodaars	10 april-10 juli.	Zowel man als vrouw roepen. Let op solitaire en zwijgzame paren.
* Wespindief	20 mei-10 augustus	Controleer roefvogelnesten. Vooral in juli letten op balts en voedselvluchten.
Boomvalk	1 mei-15 september	Vooraf in halfopen landschap. Let op niet-broeders (langdurig foeragerend) en zwijgzame paren.
Patrijs	15 februari-20 juni	Vooraf in akkergebieden. Actief in ochtend- en avondschemer.
Kwartel	20 mei-31 juli	Vooraf in akkers en hooiland. Actief rond zonsopgang en ondergang en soms 's nachts. Let op afstanden waarop roep wordt gehoord (lijkt soms dichtbij). Wanneer meerdere territoriale vogels bij elkaar dan alleen uitsluitende noteren.
* Watersnip	20 april-30 juni	Balts vooral in avond- en ochtendschemer bij vochtig en zacht weer. <i>Kloktickers</i> tellen in april-half mei.
Houtsnip	15 maart-20 juli	Maximale balts in juni in ochtend- en avondschemer. Probeer individuen te onderscheiden door verschillen in geluid.
Bosuil	1 januari-10 juli	Zang vooral in januari-februari en weer in juni. Bedelende jongen in mei-juni.
Ransuil	20 februari-20 juli	Let op roep vooral in februari-maart en op bedelende jongen in mei-juli.
Groene Specht	1 maart-31 mei	Roep vooral in maart-april. Zowel man als vrouw roepen.
* Zwarte Specht	15 maart-20 juni	Vooraf actief in april. Let op bewoond nest.
* Boomleeuwerik	15 maart-20 juni	Vooraf actief in maart-april.
Boerenzwaluw	1 juni-15 juli	Bewoonde nesten (eerste legfels) tellen.
* Blauwborst	1 april-15 juli	Zang vooral eind maart-april.
Zwarte Roodstaart	20 april-10 juli	Zang vooral half april-half mei in ochtendschemer.
Gekraagde Roodst.	10 mei-30 juni	Zang vooral half april-half mei en vaak groot deel van de dag.
* Roodborsttapuit	15 maart-15 juli	Zang vooral maart-april, alarm en uitgevlogen jongen in mei; sommige paren heimelijk.
* Snor	1 mei-10 juli	Zang vooral eind april-mei in vroege ochtend en nacht.
* Rietzanger	1 mei-20 juli	Zang vooral eind april-half mei in vroege ochtend.
Fluiter	15 mei-30 juni	Zang vooral in mei van vroeg tot laat in ochtend.
Vuurgoudhaan	1 mei-30 juni	Zang vooral in april-mei.
Wielewaal	10 mei-15 juli	Zang vooral in mei. Zowel man als vrouw kunnen zingen.
Kleine Barmseis	10 mei-31 juli	Zang en balts vooral in april-mei, maar in die periode ook doortrek. Let op nest-indicatie en waarnemingen in half mei-juli. Soms nestelend in kolonieverband.