

Toelichting gebiedeninformatie

Natura 2000 gebiedsnummer: (1) Waddenzee
 Eerste jaartal voor trendberekening: 1981
 Gemiddelde omvang populatie rond 1981: 25
 Gemiddelde omvang populatie rond 2001: 430

Tabel geeft alle Natura 2000 broedvogelsoorten per gebied

Soort	Startjaar trend	Trend vanaf startjaar	Trend vanaf 1994	Gemiddelde 79-83	Gemiddelde 99-03
Lepelaar	1981	++	++	25	430
Eider	1981	+	--	1.700	2.700
Bruine Kiekendief	1981	+	?	5	28
Blauwe Kiekendief	1990	?	?		3
Kluut	1981	-	-	4.100	3.800
Bontbekplevier	1990	0	-		62

Trend vanaf startjaar t/m 2003
 Trend over de jaren 1994-2003

Natura 2000 gebiedsnummer: (1) Waddenzee
 Eerste seizoen voor trendberekening: 1980/81
 Seizoensgemiddelde is het gemiddelde van de maanden juli t/m juni: 310
 Seizoensmaximum wordt gegeven indien geen seizoensgemiddelde beschikbaar is: 1.600

Tabel geeft alle Natura 2000 Niet-broedvogelsoorten per gebied

Soort	Functie: foerage en/of slapen	Startjaar trend	Trend t.o.v. startjaar	Trend t.o.v. 94/95	Gemiddeld seizoens gemiddelde 99/00-03/04	Gemiddeld seizoens maximum 99/00-03/04
Fuut	f	1980/81	+	?	310	
Aalscholver	fs	1980/81	++	+	4.200	
Kleine Zilverreiger	f	1995/96	++		10	
Lepelaar	fs	1980/81	++	++	520	
Kleine Zwaan	s					1.600
Toendrarietgans	s					22.000

f = aantallen overdag, veelal foeragerend; s= slaapplekken, veelal 's nachts; fs= naast de foerageerfunctie is er ook een slaapplekfunctie voor vogels die in het gebied foerageren en/of voor vogels van buiten het gebied in een onbekend aantal (aantal is de foerageerfunctie).

Trend 2003/04 t.o.v. startjaar
 Trend 2003/04 t.o.v. 1994/95

Stip is jaarcijfer, lijn is de trendwaarde en de stippellijnen geven de betrouwbaarheidsintervallen

