



Gepubliceerd op *Sovon.nl* (<https://www.sovon.nl>)

[Home](#) > Tapuit in Nederland veert weer licht op



[1]

18 juni 2021

Tapuit in Nederland veert weer licht op

De Tapuit in Nederland heeft enkele succesvolle broedseizoenen achter de rug. Dit is goed nieuws, want de aantallen Tapuiten nemen al decennia af en deze trend lijkt nu te stoppen. Stabiele zomers, met droogte en warmte gedurende de broedseizoenen 2018, 2019 en 2020 spelen vermoedelijk een positieve rol. Maar ook intensief beschermingswerk werpt zijn vruchten af.

De Tapuit is al een hele tijd een zorgenkindje. We noemen de getallen nog maar even: een afname van duizenden broedparen in de jaren zeventig (en nog véél meer daarvoor), tot slechts 210 tot 250 paar in 2013, een dieptepunt. De verspreiding is tegenwoordig nagenoeg geslonken tot de duinen van de Kop van Noord-Holland, de Waddeneilanden en het Drents-Friese Wold. Ook in de ons omringende landen doet de Tapuit het heel slecht; in Vlaanderen is de soort zelfs al enige tijd verdwenen als broedvogel. Om te voorkomen dat dat ook in Nederland gebeurt, krijgen onderzoek en bescherming van de Tapuit veel aandacht, in gang gezet door Vogelbescherming en Sovon in het Jaar van de Tapuit in 2005.

Onderzoek vanaf 2007

Om in de vingers te krijgen welke factoren de populatie Tapuiten sturen en hoe je ze het beste kunt beschermen, worden de belangrijkste Nederlandse deelpopulaties intensief gevolgd en onderzocht. Sovon doet dat in de Noordduinen tussen Callantsoog en Den Helder sinds 2007, en op Texel sinds 2016. De Tapuiten in het Aekingerzand (Drents-Friese Wold) worden sinds 2007 onderzocht door Stef Waasdorp van Stichting Biosfeer. Samen met de resultaten van het promotieonderzoek van Herman van Oosten in het Noordhollands Duinreservaat – [lees zijn geweldige boek De Tapuit van Atlas Contact](#) [2] – heeft dit ons veel inzichten opgeleverd over de ecologie van de Tapuit en zijn bescherming.



Onderzoek in de Noord-Hollandse duinen, waarbij een nest wordt geïnspecteerd. Foto: Peter Eekelder

Licht herstel

De laatste jaren veert de populatie Tapuiten in Nederland weer licht op. Na het slechte jaar 2013 werden in 2015 tot 2018 weer iets hogere aantallen geteld. In de tapuitenbolwerken waren met name 2019 en 2020 erg goede jaren. Zo zaten er in de Noordduinen in 2019 46 territoria en in 2020 maar liefst 61. Lang verlaten gebiedsdelen, zoals de Grafelijkheidsdunen werden ook weer bezet. Op Texel werden in 2020 61 tot 65 paar geteld, een flinke vooruitgang ten opzichte van 2019 (45 paar). Het belangrijkste broedgebied op Texel is de Eierlandse Duinen, hier zaten 53 paar in 2020, tegen 27 paar in 2014-2015. Op het Aekingerzand zit het aantal Tapuiten sinds 2013 (25 territoriale mannen waarvan slechts 13 waren gepaard!) ook in de lift, met een piek van 63 territoria en maar liefst 51 vrouwtjes in 2020. Overigens stijgen ook de aantallen broedparen op Vlieland en Terschelling. Momenteel zitten we midden in het broedseizoen van 2021. Voorlopige resultaten in de Noordduinen wijzen op ongeveer 57 territoria, minder dan in 2020 maar meer dan in 2019. Wel is een relatief groot aandeel vrouwtjes niet teruggekeerd, een fenomeen dat we ook in 2015 en 2018 zagen, maar nog niet goed kunnen verklaren. Hierdoor zijn ongeveer tien van de territoria bezet door een solitair mannetje.

Droogte helpt

Het heeft er alle schijn van dat de droogte van de afgelopen jaren gunstig heeft uitgepakt voor het leefgebied van Tapuiten. Hierdoor neemt de dominantie van grassen af en ontstaat een open vegetatiestructuur met lage kruiden en veel zandige plekken. Hier houden Tapuiten juist van, omdat ze vooral op de grond naar voedsel zoeken. Het vindt vermoedelijk zijn weerslag in het hoge broedsucces in 2019 en 2020. In alle drie de onderzochte gebieden was dit namelijk erg goed. Het broedsucces wordt gemeten met het aantal uitgevlogen jongen per nest en per paar. Meer neerslag in het voorjaar van 2021 lijkt weer tot een sterke vergrassing te hebben aangezet, met name in delen van de Noordduinen en de Eierlandse duinen op Texel.

Maaien, chopperen en begrazen

Maar ook beheermaatregelen, zoals maaien en chopperen, hebben een positief effect. Bij chopperen wordt de vegetatie verwijderd en een deel van de bovenste humuslaag. Winterbegrazing met schapen in de Noordduinen pakt eveneens gunstig uit, net als de recente toename van het aantal konijnen in dit gebied. Konijnen houden de vegetatie laag en open en zorgen met hun gegraaf voor zandige plekken en natuurlijk nestgelegenheid, in de vorm van holen. Op het Aekingerzand was de begrazingsdruk echter te hoog, omdat hier de schapen het hele jaar door in het gebied verbleven. Door droogte was er te weinig voedsel (gras!) voor de schapen en werd het leefgebied van de Tapuiten volledig kaal gegraasd; teveel van het goede dus. Op Texel is er nog veel winst te behalen door begrazing met schapen in te zetten in duingebieden die te dicht begroeid zijn geraakt voor Tapuiten. Dit zijn vaak gebieden die vroeger wel werden begraasd met schapen.



Kaalgestoven duinen op Texel in de droge zomer van 2020. Foto: Frank Majoor

Nestbescherming werkt

Een heel belangrijke beschermingsmaatregel blijkt het beschermen van de tapuitnesten met behulp van kippengaas. Op deze manier worden in de Noordduinen en op het Aekingerzand de nesten van Tapuiten beschermd tegen vossen. Dit zorgt ervoor dat er veel minder legsels (en soms broedende vrouwtjes) worden opgegeten en er veel jongen succesvol uitvliegen. Op het Aekingerzand is dit de belangrijkste maatregel gebleken om het aantal broedende paren weer te laten groeien. Op Texel leven geen vossen en is de enige marter die er voorkomt - hermelijn - zeldzaam. Predatie is er geen probleem, al is enige invloed van verwilderde huiskatten niet uit te sluiten.



Jonge Tapuiter met kleurringen op het Aekingerzand. Foto: Harvey van Diek

Kleurringonderzoek

Tapuiten worden op Texel, in de duinen van de Noordkop en op het Aekingerzand [van kleurringen voorzien](#) [3], het betreft dus het grootste deel van de Nederlandse populatie. Hiermee volg je de sterfte, maar ook hoe de vogels zich verspreiden binnen en tussen gebieden. Volwassen en jonge vogels zijn sterk gebonden aan hun eigen populatie: de meeste Tapuiten keren terug naar het broedgebied van het jaar ervoor of - in het geval van de jonge vogels - naar hun geboortegrond. Zes geringde jonge vogels uit de Eierlandse Duinen vestigden zich in 2020 elders, waarvan drie op Texel, één op Terschelling en één op Vlieland. Interessant was dat in 2020 een Tapuiter, geboren op het Duitse Waddeneiland Norderney, opdook als broedvogel op Texel. Een jong dat in 2016 als jong werd gekleurringd in de Noordduinen werd in de broedseizoenen van 2019 en 2020 zelfs gefotografeerd op het meest noordelijke Waddeneiland Sylt, hemelsbreed 340 kilometer verderop! Ook uit eerdere jaren zijn uitwisselingen bekend, zoals van Tapuiten van Texel die gingen broeden in de Noordduinen en vice versa, maar nooit op zo'n grote afstand. Dit geeft hoop voor de toekomst. Het betekent dat verlaten broedgebieden weer bezet kunnen worden. Dit is essentieel om de Tapuiter in Nederland er weer bovenop te helpen.

Zenders

In 2021 gaan we jonge Tapuiten in de Noordduinen kort na uitvliegen voorzien van radiozenders. We hopen zo meer te weten te komen over hun bewegingen en terreingebruik in hun eerste levensmaanden, en de omvang en oorzaken van sterfte in deze periode. De gezenderde vogels worden gevolgd met zowel handontvangers in het veld, als met automatische ontvangststations die verspreid langs de kust staan opgesteld als onderdeel van het [MOTUS-netwerk](#) [4].

Verder lezen

- [Overzicht van 13 jaar onderzoek en bescherming aan de tapuitpopulatie bij Den Helder](#) [5]
- [Tapuiten in de Eierlandse duinen op Texel in 2020](#) [6]
- [Toevlucht voor de Tapuit. Brochure over bescherming en beheer](#) [7]

Neem voor vragen over dit onderzoek contact op met [Chris van Turnhout](#) [8] of [Frank Majoor](#) [9] (Sovon).

Een eerdere versie van dit bericht werd opgesteld door Ruud van Beusekom (Vogelbescherming Nederland), samen met de uitvoerende partijen. Het onderzoek en beschermingswerk aan Tapuiten wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Programma O+BN, It Fryske Gea, Provincie Noord-Holland, Provincie Drenthe, Provincie Friesland, Nationaal Park Duinen van Texel en Stichting Vogeleiland Texel. Het zenderonderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Sander Lagerveld (Wageningen Marine Research).

[Disclaimer](#) [Privacyverklaring](#) [Voorwaarden](#) [Beheer](#)

Bron-URL: <https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/tapuit-nederland-veert-weer-licht-op>

Links

[1] <https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/tapuit-nederland-veert-weer-licht-op>

[2] <https://sovon.ccvshop.nl/De-Tapuit>

[3] <http://cr-birding.org/node/4028>

[4] <https://www.wur.nl/nl/product/Telemetrienetwerk-voor-vogels-en-vleermuizen-MOTUS.htm>

[5] <https://www.sovon.nl/nl/publicaties/demografie-van-een-populatie-tapuiten-een-snel-veranderend-duinlandschap>

[6] <https://www.sovon.nl/nl/publicaties/tapuiten-de-eierlandse-duinen-op-texel-2020>

[7] <https://www.sovon.nl/Toevlucht>

[8] <https://www.sovon.nl/nl/content/chris-van-turnhout>

[9] <https://www.sovon.nl/nl/content/frank-majoor>